

大腸がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
CAPIRI	イリリテカン	200mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	セ ^レ ロ ^ダ	1600mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (E法)			
CAPOX	エルブ ^ラ ット	130mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	セ ^レ ロ ^ダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
FOLFIRI	イリリテカン	150mg/m ²	Day1	14日	中等度	
	レボ ^ホ リ ^ナ ート	200mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
FOLFOX	レボ ^ホ リ ^ナ ート	200mg/m ²	Day1	14日	中等度	mFOLFOX6
	エルブ ^ラ ット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
FOLFOXIRI	イリリテカン	150mg/m ²	Day1	14日	高度	mFOLFOXIRI
	レボ ^ホ リ ^ナ ート	200mg/m ²	Day1			
	エルブ ^ラ ット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
S-1+IRI	イリリテカン	150mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	エスワ ^ン タイ ^ホ ウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX	エルブ ^ラ ット	130mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	エスワ ^ン タイ ^ホ ウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
Infusional 5-FU+I-LV+BEV	レボ ^ホ リ ^ナ ート	200mg/m ²	Day1	14日	軽度	
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			

ペバシズマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
CAPIRI+BEV	ペバシズマブ BS	7.5mg/kg	Day1	21日	中等度	
	イリリテカン	200mg/m ²	Day1			
	ゼロダ	1600mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (E法)			
CAPOX+BEV	ペバシズマブ BS	7.5mg/kg	Day1	21日	中等度	
	エルラット	130mg/m ²	Day1			
	ゼロダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
Cape+BEV	ペバシズマブ BS	7.5mg/kg	Day1	21日	軽度	
	ゼロダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
FOLFIRI+BEV	ペバシズマブ BS	5mg/kg	Day1	14日	中等度	
	イリリテカン	150mg/m ²	Day1			
	レボホリナート	200mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
FOLFOXIRI+BEV	ペバシズマブ BS	5mg/kg	Day1	14日	高度	mFOLFOXIRI
	イリリテカン	150mg/m ²	Day1			
	レボホリナート	200mg/m ²	Day1			
	エルラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
FOLFOX+BEV	ペバシズマブ BS	5mg/kg	Day1	14日	中等度	mFOLFOX6
	レボホリナート	200mg/m ²	Day1			
	エルラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			

ペバシズマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
FTD/TPI+BEV	ペバシズマブ BS	5mg/kg	Day1,15	28日	中等度	
	ロンサーフ	70mg/m ² /day	Day1(夕)-6(朝),Day8(夕)-13(朝):1日2回 +14日間休薬			
S-1+BEV	ペバシズマブ BS	7.5mg/kg	Day1	21日	軽度	
	エスワンタイウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
S-1+IRI+BEV	ペバシズマブ BS	7.5mg/kg	Day1	21日	中等度	
	イリリテカン	150mg/m ²	Day1			
	エスワンタイウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX+BEV	ペバシズマブ BS	7.5mg/kg	Day1	21日	中等度	
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	エスワンタイウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
Infusional 5-FU+I-LV+BEV	ペバシズマブ BS	5mg/kg	Day1	14日	軽度	
	レボ ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			

セツキシマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
CET 2週毎	ア-ビ [®] タックス	500mg/m ²	Day1	14日	最小度	
ENCO±BINI+CET(2週毎)	ア-ビ [®] タックス	500mg/m ²	Day1	14日	最小度	BRAF変異陽性
	ビ [®] ラフトビ [®]	300mg/day	1日1回 連日			
	メクトビ [®]	90mg/day	1日2回 連日			
FOLFIRI+CET(初回)	ア-ビ [®] タックス	400mg/m ²	Day1	14日	中等度	
		250mg/m ²	Day8			
	レボ [®] ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	イリノテカン	150mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)				
FOLFIRI+CET(2回目～)	ア-ビ [®] タックス	250mg/m ²	Day1,8	14日	中等度	
	レボ [®] ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	イリノテカン	150mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
FOLFOX+CET(2回目～)	ア-ビ [®] タックス	250mg/m ²	Day1,8	14日	中等度	mFOLFOX6
	レボ [®] ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	エルブ [®] ラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
IRI+CET(初回)	ア-ビ [®] タックス	400mg/m ²	Day1	14日	中等度	
		250mg/m ²	Day8			
	イリノテカン	150mg/m ²	Day1			
IRI+CET(2回目～)	ア-ビ [®] タックス	250mg/m ²	Day1,8	14日	中等度	
	イリノテカン	150mg/m ²	Day1			

パニツムマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
PANI	パニツムマブ	6mg/kg	Day1	14日	最小度	KRAS G12C変異の場合はルマケラス併用
FOLFIRI+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	Day1	14日	中等度	
	レボ ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	イリリテカン	150mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
FOLFOX+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	Day1	14日	中等度	mFOLFOX6
	レボ ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	エルブ ラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
PANI+IRI	パニツムマブ	6mg/kg	Day1	14日	中等度	
	イリリテカン	150mg/m ²	Day1			

ラムシルマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	Day1	14日	中等度	
	レボ ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	イリリテカン	150mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			

免疫チェックポイント阻害薬

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
Nivo 2週毎	オプジーボ	240mg/body	Day1	14日	最小度	MSI-High陽性
Pembro 3週毎	キイトルダ	200mg/body	Day1	21日	最小度	MSI-High陽性
Pembro 6週毎	キイトルダ	400mg/body	Day1	42日	最小度	MSI-High陽性

皮下注

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
[皮]PER+TRA(初回)	フェスコ [®]	IN(15mL)	Day1	21日	最小度	ペ [®] ルツズ [®] マブ [®] 1200mg, トラスツズ [®] マブ [®] 600mg
[皮]PER+TRA(2回目～)	フェスコ [®]	MA(10mL)	Day1	21日	最小度	ペ [®] ルツズ [®] マブ [®] 600mg, トラスツズ [®] マブ [®] 600mg

内服薬

薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	備考
エスワンタイホウ	80～120mg/day	1日2回28日間内服 +14日間休薬 (A法)	42日	補助化学療法
ゼローダ [®]	2500mg/m ² /day	1日2回14日間内服 +7日間休薬 (B法)	21日	補助化学療法
	1650mg/m ² /day	1日2回5日間内服 +2日間休薬 (D法)	7日	補助化学療法 (放射線併用)
ユーエフティー	300mg/m ² /day	1日2-3回28日間内服 +7日間休薬	35日	補助化学療法
ホリナート	75mg/day			
ロンサーフ	70mg/m ² /day	1日2回5日間内服+2日間休薬 × 2週 +14日間休薬	28日	
スチバーガ	160mg/day	1日1回21日間内服 +7日間休薬	28日	
フリュザクラ	5mg/day	1日1回21日間内服 +7日間休薬	28日	