


ペースメーカー植え込み術を受ける患者さんへ



月 日 時 分 (右 ・ 左) の鎖骨の下から手術予定です

患者名		様 主治医				担当看護師						
経過	外来～手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	手術後5日目	手術後6日目	手術後7日目	手術後8日目～	
日付	/		/		/		/		/		/	
患者の達成目標	・ 手術について理解し同意している		・ ペースメーカー不全がない ・ 内服薬等で痛みを軽減することができる ・ 創部に異常がない			・ ペースメーカー不全がない ・ 内服薬等で痛みを軽減することができる ・ 創部に異常がない		・ 退院後の日常生活について注意点が理解できる	・ ペースメーカー不全がない ・ 創部に異常がない ・ 自己検脈ができる			
	・ 入院後から心電図モニターをつけます 	・ 術衣に着替えます ・ 手術の1時間前から点滴を始めます 	・ 心電図モニターをつけます ・ 翌朝まで点滴が続きます	・ 心電図モニターをつけたまま過ごします ・ 朝と夕方に抗菌薬の点滴があります	・ 心電図モニターをつけたまま過ごします ・ 朝と夕方に抗菌薬の点滴があります	・ 心電図モニターをつけたまま過ごします ・ 創部の点検をします 			・ 退院前に心電図モニターを外します			
検査	・ 採血と胸部レントゲンがあります 		・ 胸部レントゲンと心電図検査があります	・ 採血、胸部レントゲン、心電図があります 	・ 採血、胸部レントゲン、心電図検査があります 				・ 採血、胸部レントゲン、心電図検査があります 	・ ペースメーカー点検があります	・ 8日目に採血、胸部レントゲン、心電図があります	
薬剤	・ 薬剤師が普段飲んでいるお薬の確認をします ・ 血がさらさらになるお薬を飲んでいませんか ・ 持参した内服薬の続行、休薬をお知らせします	中止薬 〔 〕 気持ちを落ち着かせるお薬(ホリゾン)を飲みます インスリン 〔 〕										
食事	・ 治療食がです 	・ (午前中に手術予定の方)朝は絶食です ・ (午後に手術予定の方)朝食が通常の1/2量、昼は絶食です	・ 手術当日はベッド上で食べます(必要時お手伝いします) ・ (午前中に手術予定の方)昼食から食事が再開します ・ (午後に手術予定の方)夕食から食事が再開されます	・ 治療食がです 								
安静活動	・ 病院内であれば特に制限はありません		・ 翌朝までベッド上安静です ・ 手術2時間後から45度の角度で座ることができます ・ 手術4時間後から90度の角度で座ることができます ・ ベッドから降りることができません ・ バストバンドをつけて手術側の脇を固定します	・ 病室内で安静にします ・ トイレ、洗面所にのみ歩いて行くことができます(初回は看護師が付き添います) ・ 手術した方の腕はバストバンドが外れた後、90度まで挙上できます	・ 手術した方の腕は90度まで挙上できます	・ 病棟内であれば制限ありません ・ 手術した方の腕は90度まで挙上できます	・ 病院内であれば制限ありません ・ 手術した方の腕は90度まで挙上できます 		ペースメーカー手帳について 退院時にお渡しします。 外出時は必ず携帯してください。			
排泄	・ 特に制限はありません	・ 尿管を挿入します	・ トイレに行くことができますので、翌朝まで尿管は入れたまま過ごします	・ 尿管を抜きます ・ 病棟内のトイレは使用できます	・ 特に制限はありません							
清潔	・ シャワー浴できます	・ シャワー浴はできません			・ シャワー浴はできません ・ 体拭き用のタオルをお渡しします	・ 下半身のみシャワー浴できます	・ 医師の許可が出たら全身シャワー浴できます ・ 創部をできるだけ濡らさないでください					
患者家族への説明	・ 医師が手術について説明します ・ 同意書が必要です ・ 転倒、転落に注意して下さい(退院まで)	・ 治療に行くとき、貴重品をご家族もしくは、看護師へお預け下さい 	・ 技師が遠隔モニタリング機器について説明します ・ 傷の痛み、胸の症状、気分不快等あれば看護師にお知らせください	・ 傷の痛み、胸の症状、気分不快等あれば看護師にお知らせください 			・ 傷の痛み、胸の症状、気分不快等あれば看護師にお知らせください ・ 検脈の練習をします 		・ 医師、看護師、薬剤師が退院後の生活やお薬に関する説明をします ・ 退院日は、状態を確認しながら、適切な時期をご相談させていただきます。			

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により手術後の経過は様々です。この表より達成が遅れると治りが悪いということはありません。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。