

未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術を受ける患者さんへ（4泊5日）



患者名 経過	入院前～手術前日	手術当日(手術前)	主治医 手術当日(手術後)	担当看護師 手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目
日付		/	/	/	/	/
患者の 達成目標	・ 治療の必要性が理解できる	・ 手術の準備が整っている	・ 合併症なく経過できる			・ 退院後の生活について理解できる
治療 処置	・ 足の付け根の毛を剃り、足の甲にマジックで印を付けます	・ 手術着に着替えます ・ 点滴をします 	・ 必要時、酸素マスクを付けます ・ 点滴をします ・ 定期的に血圧測定や症状の観察を行います	・ 頭部MRI、採血があります ・ 検査後、点滴を抜きます ・ 穿刺部の絆創膏を交換します 	・ 穿刺部の絆創膏を外します 	・ 退院の準備をしましょう
薬剤	・ 薬剤師が普段飲んでいるお薬を確認します	・ 指示のある薬のみ内服します	・ 治療後に説明します 			
食事	・ 病院食がです ・ 21時以降は飲んだり食べたりできません	・ 飲んだり食べたりできません ・ 喉が渴いた時にはうがいが出ます 	・ 問題がなければ帰室後4時間後からお水が飲めます ・ 食事に関しては治療後に説明します		・ 病院食です 	
安静・活動	・ 特に制限はありません	・ 徒歩または車いすで血管造影室に移動します 	・ 手術から4時間経過し、足の付け根の止血が確認できたら、足を動かすことができます ・ 翌朝まではベッド上で安静にします ギャッチアップは30度まで可能です ・ 横を向く場合は看護師が手伝います	・ 朝、穿刺部に問題がなければ車椅子でMRIに行きます ・ MRI後に安静度を説明します 		
排泄	・ 特に制限はありません	・ 血管造影室で尿の管が入ります		・ 尿の管を抜きます ・ 特に制限はありません		
清潔	・ シャワー浴です	・ 入浴できません		・ 看護師が身体を拭きます	・ シャワー浴です	
患者 家族 への説明	・ 医師が治療について説明します ・ 麻酔医が麻酔の説明をします ・ 同意書が必要です ・ 署名後の書類は看護師へ渡してください ・ 転倒、転落に注意して下さい(退院まで)	・ 手術時間が決まったらお知らせします 	・ 手術後はICUへ転棟します	・ 手術後の状態が安定していたら一般病棟に戻ります	〈退院指導〉 ・ 血栓予防のため、処方されたお薬は医師の指示通りにきちんと内服して下さい 飲み忘れのないようご注意ください ・ 血圧に注意しながら規則正しい生活を心がけましょう	

※ 状況により予定が変更になる場合があります。ご不明な点は看護師におたずねください。

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により手術後の経過は様々です。この表より達成が遅れると治りが悪いということではありません。

2025/03 改訂