

PEIT(経皮的肝腫瘍エタノール注入法)を受ける患者さんへ



| 患者名 | 様 | | 主治医 | 担当看護師 | | |
|----------|---|--|---|---|--|--------------------|
| 経過 | 治療前日 | 治療当日(治療前) | 治療当日(治療中) | 治療当日(治療後) | 治療後1日目 | 治療後2日目～退院まで |
| 日付 | / | | / | | / | |
| 患者の達成目標 | ・ 治療について理解し同意できる | | ・ 苦痛があれば表出できる ・ 医師の指示にあわせて呼吸、息止めができる | ・ 腹痛、吐き気など症状なく過ごすことができる | | ・ 今後の治療方針が決定する |
| 治療処置 | | ・ 点滴を始める前に術衣に着替えます ・ ベッドで処置室へ移動します  | ・ 酸素マスクをつけます ・ 心電図モニターをつけます  | ・ ベッドで病室へ戻ります ・ 穿刺部を下にして圧迫した姿勢で横になります ・ 治療終了後2時間までは、30分毎に血圧を測ります。その後2時間は、60分毎に血圧を測ります | ・ 穿刺した部位の絆創膏を貼り換えます | ・ 穿刺した部位の絆創膏を剥がします |
| 検査 | | | | | ・ 採血があります  | ・ 腹部CTを撮る場合があります |
| 薬剤 | ・ 薬剤師が普段飲んでいるお薬の確認をします ・ 血がさらさらになるお薬を飲んでいませんか ・ / より () 中止です | ・ 治療1時間前から左手に点滴をします  | ・ 点滴チューブの横から痛み止めを注射します | ・ 点滴は夕方まで続きます | | |
| 食事 | ・ 食事ができます | ・ 午前中に治療する場合、朝食はありません ・ 午後に治療する場合、昼食はありません | | ・ 治療の2時間後からお茶やお水を飲むことができます ・ 治療の3時間後から食事を食うことができます | ・ 食事ができます  | |
| 排泄 | ・ 特に制限はありません | ・ 治療に呼ばれたらトイレを済ませてください | | ・ 治療後3時間経てばトイレに行けます | ・ 特に制限はありません | |
| 安静活動 | ・ 特に制限はありません | ・ 特に制限はありません | | ・ 治療後1時間は穿刺部を下にして安静にしてください ・ その後2時間はベッド上で安静にし、治療後3時間経てばトイレまで歩けます | ・ 特に制限はありません | |
| 清潔 | ・ シャワー浴ができます | ・ 希望があれば朝早い時間にシャワー浴ができます | ・ シャワー浴できません | | ・ シャワー浴できます | |
| 患者家族への説明 | ・ 医師が治療について説明します ・ 同意書が必要です | ・ テープまけしやすい方は事前にお知らせください | | ・ 腹痛や吐き気、気分不良がある場合はすぐにお知らせください | | |

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により経過は様々です。この表より達成が遅れると治りが悪いということではありません。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。