

## 肝細胞がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
テセントリク+アバスチン	テセントリク	1200mg/body	Day1	21日	最小度	
	アバスチン	15mg/kg	Day1			
肝：RAM	サイラムザ	8mg/kg	Day1	14日	最小度	
イミフィンジ単剤	イミフィンジ	1500mg/body	Day1	28日	最小度	
イミフィンジ+イジユド	イジユド	300mg/body	Day1	28日	最小度	初回1回のみ
	イミフィンジ	1500mg/body	Day1			
Ipi+Nivo	オプジーボ	80mg/body	Day1	21日	最小度	最大4コース
	ヤホイ	3mg/kg	Day1			
Nivo 2週毎	オプジーボ	240mg/body	Day1	14日	最小度	
Nivo 4週毎	オプジーボ	480mg/body	Day1	28日	最小度	

### 採用内服薬

薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	備考
レンビマ	8~12mg/day	1日1回連日	連日	BW < 60kg : 8mg. 60kg ≤ BW : 12mg
ネクサバル	800mg/day	1日2回連日	連日	
スチバーガ	160mg/day	1日1回21日間内服 +7日間休薬	28日	
カボメティクス	60mg/day	1日1回連日	連日	空腹時に服用