


内視鏡的逆行性胆道膵管造影を受ける患者さんへ(5日間)



患者名	様	主治医	担当看護師			
経過	入院日/治療当日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目(退院予定)
日付	/		/	/	/	/
患者の達成目標	検査の準備が整う		発熱や腹痛なく痛みのコントロールができる			今後の治療方針が決定する
治療処置	- 検査前に痛み止めの坐薬を使用することがあります - 点滴前に検査着に着替えます(ズボンは履いたままで構いません) - 検査は1階のレントゲン室で行います - ストレッチャーで移動します 		- 検査後4時間は30～60分毎に血圧を測ります - 帰室後心電図モニターをつけます 			採血があります
薬剤	- 入院後から左手に点滴を行います - 普段使っている飲み薬、塗り薬、貼り薬を確認します(病院で同じものをすぐに用意できない場合があります) - 昼食後薬は原則中止です - インスリンは医師の指示により変更または中止になります		- 飲むように指示があった薬だけを飲みます - インスリンは医師の指示により変更または中止になります 			- 状態に応じ点滴が追加される場合があります - 飲むように指示があった薬だけを飲みます
食事	検査前まで少量の水のみ飲みます		検査2時間後から少量のお茶、お水を飲むことができます			- 採血結果により昼食から治療食がでます - 治療食がでます 
安静・活動	病棟内であれば制限ありません		治療後1時間はベッド上安静です			
排泄	特に制限はありません		検査後1時間まではベッド上で排泄します			
清潔	治療前まで(点滴施行前までは)シャワー浴できます(緊急の場合は、時間の都合上難しい可能性があります)		シャワー浴できます			
患者家族への説明	- 金属のついた下着は脱いでください - 入歯、眼鏡、時計や指輪は外してください - 同意書、内視鏡問診票が必要です - 心臓病、緑内障、前立腺肥大などの既往や薬物アレルギーがある場合は看護師にお知らせください - 禁煙です - 転倒、転落に注意して下さい 		- 治療中に鎮静剤を使用します - しっかり目が覚めるまでは看護師がトイレ歩行に付き添います			医師、看護師、薬剤師が退院後の生活やお薬に関する説明をします。 

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により手術後の経過は様々です。この表より達成が遅れると治りが悪いということではありません。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。