


内視鏡的逆行性胆道膵管造影を受ける患者さんへ(6日間)



患者名

様 主治医

担当看護師

経過	治療前日	治療当日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目(退院予定)
日付	/	’/		/	/	/	
患者の達成目標	- 入院生活について理解できる - 検査の必要性、検査の流れについて理解し同意できる - 不安の表出ができる	検査の準備ができる	発熱や腹痛なく痛みのコントロールができる	発熱や腹痛なく痛みのコントロールができる			今後の治療方針が決定する
治療処置		- 検査前に痛み止めの坐薬を使用することがあります - 点滴前に検査着に着替えます(ズボンは履いたままで構いません) - 検査は1階のレントゲン室で行います - ストレッチャーで移動します 	- 検査後4時間は30～60分毎に血圧を測ります - 帰室後心電図モニターをつけます 	採血があります 		採血があります	
薬剤	- 普段使っている飲み薬、塗り薬、貼り薬を確認します(病院で同じものをすぐに用意できない場合があります) - 血がさらさらになるお薬を飲んでいませんか	- 朝10時頃から左手に点滴を行います - 朝食後薬は糖尿病薬以外は通常どおり内服します - 昼食後薬は原則中止です - インスリンは医師の指示により変更または中止になります	- 飲むように指示があった薬だけを飲みます - インスリンは医師の指示により変更または中止になります	- 状態に応じ点滴が追加される場合があります - 飲むように指示があった薬だけを飲みます 			
食事	治療食がでます	- 飲んだり食べたりできません - 喉が渇いた時にはうがいが出てきます	検査2時間後から少量のお茶、お水を飲むことができます	採血結果により昼食から治療食がでます	治療食がでます 		
安静・活動	特に制限はありません	病棟内であれば制限ありません	治療後1時間はベッド上安静です				
排泄	特に制限はありません			検査後1時間まではベッド上で排泄します	特に制限はありません		
清潔	治療前まで(点滴施行前までは)シャワー浴できます			シャワー浴できません	シャワー浴できます		
患者さんご家族への説明	- 同意書、内視鏡問診票が必要です - 禁煙です - 心臓病、緑内障、前立腺肥大などの既往や薬物アレルギーがある場合は看護師にお知らせください - 転倒、転落に注意して下さい	- 金属のついた下着は脱いでください - 入歯、眼鏡、時計や指輪は外してください 	- 治療中に鎮静剤を使用します - しっかり目が覚めるまでは看護師がトイレ歩行に付き添います				医師、看護師、薬剤師が退院後の生活やお薬に関する説明をします。 

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により手術後の経過は様々です。この表より達成が遅れると治りが悪いということではありません。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。

2025年09月 改訂