

胆道がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
GEM(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8.15	28日	軽度	
GEM(biweekly)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.15	28日	軽度	
GC(GEM+CDDP)	シスプラチン	25mg/m ²	Day1.8	21日	中等度	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8			
GEM+S1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8	21日	中等度	
	エスワンタイホウ	60~100mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (F法)			
GCS(GEM+CDDP+S1)	シスプラチン	25mg/m ²	Day1	14日	中等度	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1			
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day8(朝):1日2回 +7日間休薬 (E法)			

免疫チェックポイント阻害薬

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
イミフィンジ+GC	イミフィンジ	1500mg/body	Day1	21日	中等度	最大8コース
	シスプラチン	25mg/m ²	Day1.8			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8			
イミフィンジ単剤	イミフィンジ	1500mg/body	Day1	28日	最小度	イミフィンジ+GC後維持
キイトルーダ+GC	キイトルーダ	200mg/body	Day1	21日	中等度	最大8コース
	シスプラチン	25mg/m ²	Day1.8			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8			
キイトルーダ+GEM	キイトルーダ	200mg/body	Day1	21日	中等度	キイトルーダ+GC後維持
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8			