

膵がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
GEM+S1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1,8	21日	中等度	
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
GEM(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1,8,15	28日	軽度	
GEM(biweekly)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1,15	28日	軽度	
mFOLFIRINOX	エルゾラット	85mg/m ²	Day1	14日	高度	
	レボホリナート	200mg/m ²	Day1			
	イリリテカン	150mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2:46時間持続			
nab-PTX+GEM	アブラキサン	125mg/m ²	Day1,8,15	28日	中等度	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1,8,15			
オニバイド+5-FU/LV	オニバイド	70mg/m ²	Day1	14日	中等度	
	レボホリナート	200mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2:46時間持続			

採用のある内服薬

薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	備考
エスワンタイホウ	80~120mg/day	1日2回28日間内服 +14日間休薬 (A法)	42日	補助化学療法