

血栓除去、血管内治療(カテーテル治療)を受ける患者さんへ



患者名	様	主治医	担当看護師	
経過	入院日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1日～5日目(退院)	治療後6日目(退院)
日付	/		/ ~ /	/
達成目標	- 治療の準備ができる - 治療について理解できる	- 体温、脈拍、血圧が安定している - 穿刺部の出血、痛み、腫れがない	穿刺部の出血、痛み、腫れがない	退院後の生活について理解できる
治療処置	血管造影室入室前までに点滴をします	治療終了後、血流検査があります		
薬剤	- 普段使っている飲み薬、塗り薬、貼り薬、水薬、目薬を確認します(病院で同じものをすぐに用意できない場合があります) - 抗凝固薬は、別途説明します - 治療前の血糖降下剤、インスリンがあれば中止ですが、他のお薬は通常通り内服可です(抗凝固薬は、別途説明します)	帰室後より内服薬はすべて再開です(抗凝固薬の再開は、別途説明します) 	制限はありません	
食事	- 病院食がでます - 既往に糖尿病がある方は、間食はできません - 午前(12時まで)の治療の場合は、朝食はありません - 午後(12時から)の治療の場合は、昼食はありませんが、少量の水分は可です	帰室後より水分、食事すべて再開です	制限はありません	
安静・活動	制限ありません(足壊疽、潰瘍がある場合は、原則治療する方の足は、下につくことはできません。移動は基本車いすです)	- 止血器具を使用した場合は、帰室30分で座位可、また帰室3時間で歩行可です - 止血器具を使用しない場合は、帰室後6時間は、穿刺側の股関節と膝関節は曲げられません。6時間後から活動に制限はありません	制限はありません	
排泄	病棟で尿管を入れます		トイレまで歩行が可能であれば、尿管を抜きます	
清潔	シャワーは入れません(必要があれば体拭きができます)		シャワー浴可です	
患者家族への説明	- 治療の同意書にサインをいただきます - 治療へ行く時は、貴重品は家族へ預けて下さい - 不安なことや聞きたいことがあればお知らせ下さい - 転倒、転落に注意して下さい(退院まで)	穿刺部の出血、痛み、腫れがあればお知らせ下さい	〈退院時指導〉 - 水分をこまめに摂取しましょう - 不整脈がある方は、循環器内科を受診しましょう	

※この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により経過は様々です。
 ※ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。

2025年2月 改訂